

■ Comment fonctionne ce médicament antifibrinolytique?

L'acide tranexamique (Cyklokapron)

- est un médicament qui aide un caillot à rester en place assez longtemps pour laisser guérir une plaie.
- n'aide PAS à la formation d'un caillot.
- est utile seulement une fois que le caillot est formé.
- NE PEUT PAS être utilisé au lieu de la desmopressine ni du facteur de remplacement.

■ Quand peut-on utiliser ce médicament?

On peut l'utiliser pour aider à garder le caillot en place là où il y a une « membrane muqueuse », c'est-à-dire aux endroits du corps où la peau est mince et fragile, comme :

- à l'intérieur de la bouche
- à l'intérieur du nez
- à l'intérieur des intestins
- à l'intérieur de l'utérus

Vous pouvez utiliser ce médicament si vous allez chez le dentiste et si vous pensez que les soins dentaires vous feront saigner. Les femmes qui perdent beaucoup de sang pendant leurs règles peuvent aussi l'utiliser.

■ Que faut-il savoir avant d'utiliser ce médicament?

Communiquez avec votre centre de traitement de l'hémophilie avant d'utiliser l'acide tranexamique. Donnez à votre médecin ou à votre infirmière le nom de tous les autres médicaments que vous prenez. Il y a des médicaments et certains concentrés de facteur qu'il ne faut pas prendre en même temps que l'acide tranexamique.

■ Quand ne faut-il PAS utiliser ce médicament?

- L'acide tranexamique n'est PAS utile pour les saignements dans les articulations.
- Vous ne devez PAS le prendre s'il y a du sang dans vos urines. Pourquoi? Parce qu'un caillot de sang pourrait bloquer les voies urinaires.

■ Comment dois-je prendre ce médicament?

- Vous pouvez le prendre par la bouche, sous forme de pilule ou de liquide, en général pendant cinq à sept jours.
- Si vous avez du mal à avaler les pilules, vous pouvez les écraser et les ajouter à votre nourriture ou à un liquide, par exemple du jus.
- Une autre façon de prendre ce médicament est de l'injecter dans une veine. On utilise cette méthode avant une intervention chirurgicale.
- Si vous avez déjà pris ce médicament par le passé, la quantité dont vous avez besoin peut être différente de la dernière fois. C'est pourquoi vous devez toujours vérifier la quantité que vous devez prendre.

■ Est-ce qu'il y a des effets secondaires?

Les effets secondaires sont rares. Voici quelques effets secondaires légers que vous pouvez ressentir :

- nausée
- fatigue ou sommeil
- étourdissements
- diarrhée
- mal à l'estomac

Ces effets secondaires légers disparaissent habituellement. S'ils ne disparaissent pas, vous pouvez prendre le médicament avec de la nourriture.

Ou, après avoir consulté le médecin à la clinique, vous pouvez :

- arrêter de prendre l'acide tranexamique, OU
- diminuer la quantité d'acide tranexamique.

■ Pour plus de renseignements

Adressez-vous à votre centre de traitement si vous avez des questions au sujet de l'acide tranexamique. Vous pouvez aussi poser des questions sur votre trouble de la coagulation.

CENTRE DE TRAITEMENT :

NUMÉRO(S) DE TÉLÉPHONE DU MÉDECIN :

NUMÉRO(S) DE TÉLÉPHONE DE L'INFIRMIÈRE :

■ Remerciements

Ce texte a été révisé par des membres de l'Association canadienne des infirmières et infirmiers en hémophilie (ACIHH).



Sherry Purcell, inf. aut., infirmière-coordonnatrice
South Eastern Ontario Regional
Inherited Bleeding Disorders Program
Kingston General Hospital
Kingston (Ontario)

Claudine Amesse, inf. aut., infirmière-coordonnatrice
Centre d'hémostase
CHU Sainte-Justine
Montréal (Québec)

Un grand merci à tous ceux qui ont aussi passé ce dépliant en revue :

L'Association des infirmières et infirmiers en hémophilie

D^{re} Paula James, codirectrice
South Eastern Ontario Regional
Inherited Bleeding Disorders Program
Kingston General Hospital
Kingston (Ontario)

Dr Georges-Étienne Rivard, directeur médical
Centre d'hémostase
CHU Sainte-Justine
Montréal (Québec)

■ La Société canadienne de l'hémophilie

La Société canadienne de l'hémophilie (SCH) travaille à améliorer l'état de santé et la qualité de vie de toutes les personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation et à trouver une cure définitive à ces maladies.

La SCH consulte des médecins qualifiés avant de diffuser quelque renseignement de nature médicale que ce soit. Par contre, la SCH ne pratique pas la médecine et ne peut, en aucun cas, recommander des traitements spécifiques à des individus donnés. Les noms de marques de produits thérapeutiques ne sont fournis qu'à titre d'information. Leur inclusion ne signifie pas que la SCH appuie ces produits ou leur fabricant. Dans tous les cas, on recommande fortement aux personnes de consulter un médecin spécialiste de l'hémophilie avant d'entreprendre quelque traitement que ce soit.

Pour plus de renseignements, communiquez avec :

La Société canadienne de l'hémophilie
400-1255, rue University
Montréal (Québec)
H3B 3B6

Téléphone : 514 848-0503
Numéro sans frais : 1 800 668-2686
Télécopieur : 514 848-9661
Courriel : chs@hemophilia.ca
Site web : www.hemophilia.ca

ACIDE TRANEXAMIQUE

Cyklokapron

Guide pour les patients et les aidants

CYKLOKAPRON



Société canadienne de l'hémophilie
Arrêtons l'hémorragie

www.hemophilia.ca